

タダラフィル錠 (デイリー服用タイプ)

毎日飲むことで効果を安定させるED治療薬です。

血中濃度を一定に保ち、「タイミングを気にしない自然な反応」をサポートします。



用法・用量：1日1回1錠 (毎日同じ時間に服用)

- ・食事の影響は受けにくい薬です
- ・夕食後や就寝前など、決まった時間に服用してください

【飲み忘れた場合】 気づいた時に1回分を服用してください。
ただし次の服用時間が近い場合は1回飛ばし、2回分を同時に飲まないでください。

効果・効能： ① 勃起不全 (ED) の改善

低容量の服用を続けることで、性行為のタイミングを気にすることなく、性的刺激があった際に自然な勃起を促します。薬を飲んだだけで勃起することはありません。

② 男性更年期症状の改善サポート

血流改善作用により、性欲低下・活力低下・疲労感などの男性機能低下症状の改善が期待されます。
※ホルモン補充薬ではありません。

③ 排尿トラブルの改善

前立腺・膀胱周囲の血流を改善し、尿が出にくい・尿の勢いが弱い・頻尿／夜間頻尿などの症状改善にも効果があります。EDと排尿症状を同時にお持ちの方に適しています。

主な副作用： 頭痛、ほてり、顔の紅潮、消化不良、鼻づまり、目の充血

多くは一時的なものですが、気になる場合は医師にご相談ください。

【すぐ泌尿器科への受診が必要な症状】

- ・4時間以上続く痛みを伴う勃起 (持続勃起症) ・急な視力／聴力低下 ・強い胸痛

注意事項 (必ずご確認ください)

- 以下の項目に該当する方は、絶対に本剤を服用しないでください。
 - ・硝酸薬 (ニトログリセリン等) を使用中の方 (飲み薬、塗り薬、吸入薬、貼り薬すべて含む)
 - ・心血管系障害 (重度の心不全、不安定狭心症など) をお持ちの方
 - ・脳血管疾患 (脳出血、脳梗塞) や心筋梗塞の既往歴が半年以内にある方
 - ・網膜色素変性症 (進行性の夜盲症) の方
- 本剤は女性の更年期障害・性機能障害への適応はありません。
- 体調の変化や強い副作用が出た場合は服用を中止し、速やかに当院までご連絡ください。

💡 デイリー服用のポイント

- ・数日～1週間で効果が安定します
- ・自己判断で増量しないでください
- ・継続が大切です



ロナロナクリニック

オンライン診療専用 TEL. 03-3528-8811 受付時間 11:00～18:00 休診日：木・日

デイリータダラフィル Q & A

【薬について】

Q このお薬を飲むとムラムラしますか？

A いいえ。本剤は性的興奮を高める薬ではありません。性的刺激があった際に、自然な勃起をサポートするお薬です。服用しただけで勃起することはありません。

Q いつから効果が出ますか？

A 数日～1週間ほどで血中濃度が安定し、効果を実感しやすくなります。即効性のお薬ではありませんので、継続が大切です。

Q 効果を感じられません。増量してもいいですか？

A 自己判断での増量はしないでください。デイリー服用は血中濃度を安定させることで効果を発揮します。効果が不十分な場合は、用量調整が必要なことがありますので医師へご相談ください。

Q 途中でやめると元の症状に戻りますか？

A 中止するとお薬の効果は徐々に消失します。本剤は根本治療薬ではなく、機能改善をサポートするお薬です。症状の原因自体が改善していない場合は、元の状態に戻る可能性があります。

Q お薬に体が慣れてしまうことはありませんか？

A 依存性はありません。効果が弱くなる場合は、体調・ストレス・睡眠不足などが影響していることもあります。自己判断せずにご相談ください。

Q 頭痛やほてりが出ました。これは副作用ですか？

A 比較的好くみられる副作用です。頭痛に対しては市販の頭痛薬（イブ、ロキソニン）の併用が可能です。多くは一時的で軽度ですが、強い場合や長く続く場合は医師へご相談ください。

Q 女性の更年期障害にも効果がありますか？

A 本剤は男性を対象としたお薬です。女性の更年期障害に対する適応はありません。女性の方で更年期症状でお悩みの場合は、婦人科での専門的な治療をご検討ください。

【飲み合わせ】

Q お酒と一緒に飲んでも大丈夫ですか？

A 少量であれば問題ありませんが、めまい等が出やすくなる場合があります。過度の飲酒は低血圧や勃起機能低下の原因となるためお控えください。

Q 性行為の前に通常のED薬を追加して飲んでも大丈夫ですか？

A 併用はしないでください。血圧低下や副作用が強くなるおそれがあります。追加が必要と感じる場合は、自己判断せず医師にご相談ください。

Q デュタステリド・フィナステリドと一緒に飲んでも大丈夫ですか？

A 基本的に併用可能です。AGA治療薬と併用されている方も多くいらっしゃいます。体調変化があればご相談ください。

Q ミノキシジルと一緒に飲んでも大丈夫ですか？

A 内服・外用ともに基本的に併用可能です。ただし、内服のミノキシジルをご使用中の方は、まれに血圧が下がりやすくなる場合があります。めまいや動悸があればご相談ください。

Q 内科で高血圧の薬を処方されています。一緒に飲んでも大丈夫ですか？

A 多くの降圧薬とは併用可能です。ただし一部の血管拡張薬では血圧が下がりすぎる場合があります。現在お薬を服用中の方は必ず医師へ申告してください。