

フィナステリド

AGA (男性型脱毛症) 治療薬「プロペシア」のジェネリック医薬品です。

継続して服用することによって、髪の毛が太くなる髪の毛が増えるといった効果が期待できます。

一度に大量に服用しても高い効果がみられることはありません。副作用等のリスクもある為、必ず指示に従って服用してください。



作用機序

AGAの原因のとなる男性ホルモン・DHT(ジヒドロテストステロン)を生成する5α-還元酵素をフィナステリドが阻害することでテストステロンがDHTに変換されることを抑制し、AGAを改善します。

DHTによって短縮されたヘアサイクルや頭皮環境を正常に戻し、抜け毛の進行を防止することが出来る点が最大の特徴です。

用法・用量： 1日 1回 1錠 水またはぬるま湯で服用してください

※食事の影響を受けないお薬ですのでいつでも服用することができます。

※服用の間隔は24時間あけてください。

注意事項：

- 錠剤は噛んだり、なめたりせずに服用してください。口の中を刺激する場合があります。
- 円形脱毛、抜毛癖、甲状腺機能低下による抜毛、感染症や抗がん剤使用に伴う抜毛は適応ではありません。
- 女性や子供は絶対に服用しないでください。
- 粉砕や破損した薬剤には触れないでください。皮膚から成分を吸収する可能性があります。
- 妊娠している女性が服用、または薬剤に触れた場合、男性胎児の生殖器などの発達に影響を及ぼす恐れがあります。

ご使用いただけない方

- ・女性 ・20歳未満の男性 ・フィナステリドの成分に過敏症がある方
- ・肝機能障害のある方 ・うつ病またはうつ病の既往歴がある方

副作用：

初期の脱毛(1~2ヶ月目に出現)、肝機能障害、過敏症、掻痒症、蕁麻疹、発疹、血管浮腫(口唇、舌、咽頭及び顔面浮腫を含む) 睾丸痛、血清液症、男性不妊・精液の質低下(精子濃度減少、無精子症、精子運動性低下、精子形態異常等)、リビドー減退、勃起機能不全、射精障害、精液量減少、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇

初期の脱毛について

お薬の使用を開始すると、一時的に抜け毛が増えることがあります。「初期脱毛」といわれる症状で、成長不十分だった毛が新しい髪に生え変わる為に起こる抜け毛のことです。

期間は1~3ヶ月程度で、以降半年を目安に毛が増えていきます。(ごくまれに6ヶ月目に2回目の初期脱毛が起こる方もいらっしゃいます。) 継続して服用することで症状は落ち着いてきますが、ご心配な方は診察いたしますのでご連絡ください。

副作用が出て治療が中断された場合も、お薬の返品・返金は致しかねます。ご了承ください。



ロナロナクリニック

オンライン診療専用 TEL. 03-3528-8811 受付時間 11:00~18:00 休診日: 木・日