

# タダラフィル錠

(先発:シアリス)

飲むタイミング



効果の発現



作用時間



**用法・用量：** 1回 1錠 性行為の約1時間前

服用後、30~36時間程度効果が持続します。

服用のタイミングは性行為の1時間前としていますが、3時間前の空腹時がおすすめです。

**次の服用は24時間あけてください。**

**効果・効能：** タダラフィル錠は、男性の勃起不全 (ED) の治療に使用される医薬品です。服用後も性的刺激のない状態では勃起しません。性的刺激を受けて初めて勃起し、性的刺激が中止されれば (性行為が終了すれば) 勃起はおさまります。

効果が出るまでの時間がやや長く、効果の持続時間も長い特徴があります。ED薬の中では最も人気のあるお薬です。

**副作用：** 頭痛、ほてり・紅潮、消化不良、鼻のつまり、目の充血

まれに、深刻な副作用が発生することがあります。4時間以上勃起が持続する場合は直ちに医療機関 (泌尿器科) を受診してください。

**注意事項：** ・硝酸薬を使用中、心疾患をお持ちの方は、本剤を服用できません。

・脳血管に病気のある方、網膜色素変性症をお持ちの方は服用できません。

・お薬のパンフレットも必ずお読みください。

・副作用でお悩みの場合は、服用を中止し当院までご連絡ください。

再度のご購入はこちらから

<https://lonalona.square.site/>



ロナロナクリニック

オンライン診療専用 TEL. 03-3528-8811 受付時間 11:00~18:00 休診日: 木・日

## ED治療薬Q&A

### 【効果について】

**Q** ED薬を飲むとムラムラしますか？

**A** 気分を高揚させる作用はなく、性的な刺激が加わって初めて勃起を助けます。性的刺激（性行為）が中止されれば、勃起はおさまりません。

**Q** 初めて飲むので、効果が出過ぎないか心配です

**A** 初めての方は半錠からでも使用が可能です。その場合はピルカッターなどを用いて錠剤を半分にしてください。カットしたお薬は、高温多湿を避け、2週間を目安に使い切ってください。

**Q** 半錠でも効果があったのですが

**A** 無理に増量する必要はありませんが、効果の実感がなくなってきたら増量してください。

### 【副作用】

**Q** 頭痛、ほてりが出ました。これは副作用ですか？

**A** 頭痛やほてりは約4割の方に出現する副作用です。頭痛に対しては市販の頭痛薬（イブ、ロキソニン）を併用してください。症状は時間の経過と共に自然に消失しますのでご安心ください。

### 【飲み合わせ】

**Q** お酒と一緒に飲んでも大丈夫ですか？

**A** 少量でしたら問題ありませんが、服用中はお酒で酔いやすくなります。また、過度な飲酒は低血圧や効果を弱めますのでお控えください。

**Q** デュタステリドやミノキシジルと一緒に飲んでも良いですか？

**A** デュタステリドとの併用は問題ありませんが、ミノキシジルを内服する際は、下記の通り時間を空けてご使用ください。



### 【その他】

**Q** 薬を飲んだのに性行為を行いませんでした。問題ないでしょうか？

**A** 性的な刺激が加わって初めて勃起を助けますので、特に問題はありません。

**Q** お薬に身体が慣れてしまうことはありませんか？

**A** お薬に対して耐性がつくことは基本的にありません。